

THÔNG BÁO
Về tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa Hè thu 2026
và hướng dẫn biện pháp phòng trừ

Hiện nay, toàn tỉnh đã gieo cấy 36.500 ha lúa vụ Hè Thu. Lúa trà đầu và trà chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh, các địa phương đang tiến hành bón thúc và tỉa dặm. Nhìn chung cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Thời gian qua, do điều kiện thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào và dông tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh gây hại, đặc biệt sâu cuốn lá nhỏ hại lúa. Tính đến ngày 17/6/2026, diện tích sâu cuốn lá gây hại 247 ha, mật độ phổ biến 10-15 con/m², cục bộ 20-30 con/m², sâu tuổi 1-2. Tập trung chủ yếu ở xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị như Quảng Trạch, Tân Mỹ, Tân Gianh, Ba Đồn, Nam Ba Đồn, Bố Trạch, Sen Ngu và một số địa phương khác.

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục nắng nóng, lúa đang giai đoạn bón thúc, dặm tỉa nên tạo điều kiện cho sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại nặng nếu không được phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra trong thời gian tới, không để sâu bùng phát và gây hại nặng vào giai đoạn lúa giai đoạn làm đòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và triển khai phòng trừ kịp thời theo các biện pháp kỹ thuật như sau:

1. Biện pháp phòng trừ

Hiện nay sâu chủ yếu đang ở giai đoạn T1-2, đây là giai đoạn sâu non rất mẫn cảm với thuốc bảo vệ thực vật nên việc phòng trừ sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tập trung theo dõi những chân ruộng xanh tốt, bón thừa đạm hoặc có mật độ sâu cao. Phun thuốc khi sâu có mật độ từ 20-30 con/m² trở lên bằng các loại thuốc có một trong các hoạt chất *Isocycloseram*, *Indoxacarb*, *Chlophenapyr*, *Nereistoxin*.....

- Lưu ý khi sử dụng thuốc:

- + Phải đảm bảo đủ lượng nước pha thuốc từ 20 - 25 lít/500m²;
- + Trong quá trình phun thuốc phải thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng” và thu gom bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng theo quy định.

+ Nếu sâu đã ở tuổi lớn (đã cuốn lá) cần phải chọn và sử dụng các loại thuốc có khả năng lưu dẫn (nội hấp) thì trừ sâu mới hiệu quả.

2. Biện pháp chăm sóc sau phòng trừ

Để giúp cho cây lúa phục hồi nhanh nhất sau khi phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ gây hại cần thực hiện các biện pháp chăm sóc như sau:

- Bón thúc lại sau khi phun thuốc 5-7 ngày, đặc biệt những ruộng sâu cuốn lá gây hại nặng. Sử dụng phân bón có hàm lượng đạm thấp, tăng cường kali và trung lượng, vi lượng để thúc đẩy sinh trưởng và giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã, tăng khả năng đẻ nhánh.

- Thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm các đối tượng dịch hại để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Giai đoạn này, các đối tượng dịch hại có thể phát sinh gây hại nặng như: Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, nhện gié,....

Trên đây là thông báo tình hình sâu cuốn lá nhỏ hại lúa và hướng dẫn biện pháp phòng trừ, chăm sóc cây lúa ở giai đoạn đẻ nhánh. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, phường quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở NN & MT (B/c);
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm: Khuyến nông; Giống Nông nghiệp;
- Báo -Phát thanh truyền hình tỉnh;
- Lưu VT.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Hồ Khắc Minh